



***Amylocystis lapponicus* (ROMELL) BONDARTSEV & SINGER, (1944)**
późnoporka czerwieniejąca [amylek lapoński]

- Owocnik** Owocniki jednoroczne. **Kapelusze** bokiem przyrośnięte do podłoża lub rozpostarto odgięte, rzadko rozpostarte; 50-150 mm szerokości, płaskie, ku nasadzie grubiejące, do 30 mm grubości, półkoliste, rzadziej muszlowate, zwykle pojedyncze, rzadziej dachówkowato zrośnięte; powierzchnia filcowata, szczeciniasto, przylegająco owłosiona, z wiekiem naga; z początku biała, rdzawobiała, przy ucisku i z wiekiem (oraz przy wysychaniu) czerwionordzawa; nierówna, nieregularnie falisto powyginana; niestrefowana; brzeg tępy do ostrego, zwykle ciemniejszy i owłosiony.
- Pory** białe, z wiekiem i przy ucisku czerwionobrazowawe, wyschnięte ciemnobrazowe; kanciaste do labiryntowatych, 0.3-0.5 mm szerokości, 2-3(4) na mm. **Rurki** 1-4 mm długości.
- Mięsz** biały do ochrowego, przy górze czerwonawy; świeży o soczystej, mięsnej konsystencji, wyschnięty twardy jak kość; do 20 mm grubości. Zapach przyjemny, silny ale zanikający. *Wg. mojej obserwacji w pierwszym odczuciu przypomina zapach spalonych kapiszonów lub "zapach gabinetu dentystycznego".* Smak nieco gorzki, podobny do anyżu.
- Zarodniki** Wysyp zarodników biały. Zarodniki wydłużone, elipsoidalne, u podstawy nieco zaokrąglone, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, $7-10 \times 2.5-3.5 \mu\text{m}$.
- Występowanie** Bardzo rzadki. Gatunek związany z pierwotnymi lasami iglastymi. Owocniki wyrastają w lipcu i sierpniu (także wczesną wiosną po stopieniu się śniegu), na leżących, silnie zbutwiałych, kłodach świerku, jodły, sosny, w miejscach ocienionych i wilgotnych.

Status na Czerwonej Liście: E - wymierający.

Wartość W Polsce podlega ochronie. Powoduje [brunatną zgniliznę drewna](#).

Uwagi Nazwa rodzajowa odnosi się do amyloidalnych cystyd. Podobny *drobnoporek kruchy* (*Tyromyces fragilis*) (= *Oligoporus fragilis*) różni się brakiem amyloidalnych cystyd.

Literatura Domański S., Orłowski H., Skirgiełło A., 1967 - Flora Polska. Grzyby (*Mycota*). Tom III. Żagwiowate II (*Polyporaceae pileatae*), Szczeciniakowate II (*Mucronoporaaceae pileatae*). Lakownicowate (*Ganodermataceae*). Bondarzewowate (*Bondarzewiaceae*). Boletkowate (*Boletopsidaceae*). Ozorkowate (*Fistulinaceae*). p.144 [17]
Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 - Houby. p.112 [49]

informacje o gatunku pochodzą ze strony prowadzonej przez Pana Marka Snowarskiego www.grzyby.pl