



Antrodia albobrunnea (ROMELL) RYVARDEN, NORW. JI Bot. 20; 8 (1973)
jamkówka białobrzowa [jamczatka białobrunatna]

- Owocnik **Owocnik** rozpostarty, młody ściśle przyrośnięty, wysychając luźno przyrośnięty do podłoża; do 5 mm grubości; brzeg płonny, czasem szeroki i wełnisty; młody owocnik miękki, suchy twardy.
Pory białe, z wiekiem w rdzawobrzowe plamy i brązowiejące; 3-5 na mm; okrągłe do kanciastych, na pionowym podłożu wydłużone; ściany rurek cienkie. **Rurki** 1-3 mm długości, białe do bladobrzowych.
Mięsz watowaty, 0.5-3 mm grubości, białawy, ochrowy, z ciemną, cynamonowobrzową strefą w części przylegającej do podłoża.
- Zarodniki Zarodniki wydłużone, fasolkowate do cylindrycznych, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, cienkościenne, $5-7 \times 1.5-2 \mu\text{m}$.
- Występowanie Bardzo rzadka. Owocniki roczne, wyrastają na drewnie drzew iglastych, głównie sosny.
- Status na Czerwonej Liście: E - wymierający.**
- Wartość W Polsce podlega ochronie. Powoduje [brunatna zgniliznę drewna](#).
- Uwagi Często spotykana jest podobna *Antrodia serialis*. Też rośnie na pniach drzew iglastych, zwykle na drewnie świerkowym, ma tendencję do tworzenia wąskich, odgiętych kapelusików.

Literatura Gilbertson, R.L., L. Ryvarden, 1986-1987 - North American Polypores. Volume 1 & 2. [91]
Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 - Houby. p.120 [49]

informacje o gatunku pochodzą ze strony prowadzonej przez Pana Marka Snowarskiego www.grzyby.pl