



Fomitopsis rosea (ALB. & SCHWEIN.) P. KARST.
pniarek różowy

- Owocnik** Owocniki małe, 30-80(100) mm szerokości, wystaje 10-30 mm, do 30 mm grubości, pory, miąższ i przyrastające części kapelusza w odcieniach różu; wieloletnie. **Kapelusz** bocznie przyrośnięty, kopytowany, z rurkami nieco zbiegającymi po podłożu; owocniki czasem zrosnięte po kilka lub nietypowej formy; górna powierzchnia początkowo brudnoróżowa, szybko ciemnieje, szaroróżowa, purpurowobrązowa, czarniawa; powierzchnia początkowo przylegająco owłosiona, potem naga; nierówna, koncentrycznie żłobkowana, brodawkowana, czasem spękana; brzeg początkowo ostry, z wiekiem tępy i pofalowany; brzeg bez porów.
- Pory** bladuróżowe, uciśnięte brązowieją; drobne, 3-5 na mm, 0.1-0.3 mm średnicy, koliste do nieco kanciastych. **Rurki** tej samej barwy, 1-5(7) mm długości w warstwie, granice pomiędzy przyrostami niewyraźne.
- Miaższ** białoróżowy do winnorożowego, niewyraźnie strefowany, po wysuszeniu brudnocielisty; twardy, w konsystencji korkowaty lub zdrewniały, przy rozrywaniu włóknisto-włóknisty. Zapach słaby, grzybowy. Smak słaby, gorzkawy.
- Zarodniki** Wysyp zarodników biały. Zarodniki wydłużone elipsoidalne, do cylindrycznych, na jednym końcu zastrzone i wygięte, gładkie, nieamyloidalne, bezbarwne, niektóre z kroplami, $5.5-7.5 \times 2-2.5 \mu\text{m}$.
- Występowanie** Nieczęsty, częstszy w wyższych położeniach, pospolicie w Białowieży. Owocniki wyrastają głównie na drewnie świerku, rzadziej na innych iglastych, sporadycznie na liściastych. W Polsce podlega ochronie.

Status na Czerwonej Liście: E - wymierający.

- Wartość** W Polsce podlega ochronie. Powoduje [brunatną zgniliznę drewna](#). Na drewnie konstrukcyjnym, w kopalniach, piwnicach, tworzą się owocniki o nietypowej, nieregularnej lub rozpostartej formie.
- Uwagi** Gatunek wybitnie charakterystyczny różową barwą porów i miąższu. Różowy hymenfora ma też *Leptoporus mollis* i *Tyromyces placenta* - ich owocniki są miękkie, nie zdrewniałe.

Literatura Domański S., Orłowski H., Skirgiełło A., 1967 - Flora Polska. Grzyby (*Mycota*). Tom III. Żagwiowate II (*Polyporaceae pileatae*), Szczeciniakowate II (*Mucronoporaaceae pileatae*). Lakownicowate (*Ganodermataceae*). Bondarcewowe (*Bondarzewiaceae*). Boletkowate (*Boletopsidaceae*). Ozorkowate (*Fistulinaceae*). p.178 [17]
Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 - Houby. p.127 [49]
Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 - Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi n.388 [26II]

informacje o gatunku pochodzą ze strony prowadzonej przez Pana Marka Snowarskiego www.grzyby.pl