



Grifola frondosa (DICKS.) GRAY
żagwica listkowata

- Owocnik** Owocniki w formie dużych wiązkowatych, krzaczkowatych, skupień wielu łopatkowatych kapeluszy; szerokość całej wiązki 200-500(1000) mm. **Kapelusz** ochrowe, szaro-brązowe do czarno-popielatych, ku podstawie jaśniejsze; o powierzchni promieniście włóknkowej i promieniście pomarszczonej; kapelusze łopatkowate, muszlowate, liściowate, do 100 mm długości i szerokości, z bocznym trzonem; brzeg kapelusza cienki, zatokowato falisty. Poszczególne kapelusiki wyrastają z centralnego, krótkiego, do 20 mm grubego, wielokrotnie krzaczkowato rozgałęzionego trzonu; trzon białawy, kremowy; końcowe odcinki przybliżone. **Pory** białawe do kremowych, uciśnięte nie zmieniają barwy; drobne 0.2-0.3(0.5) mm średnicy, (1)2(3) na mm, kanciaste lub zaokrąglone; brzeg postrzępiony. **Rurki** jednowarstwowe, krótkie, 2-3(5) mm długości, daleko zbiegają po trzonku. **Miaższ** białawy, konsystencji włóknistej, skórzasto-mięsistej; w kapeluszu 3-5 mm grubości; zapach świeżych owocników przyjemny, grzybowy, aromatyczny, swoisty, przy wysychaniu nieprzyjemny (starego sera, myszy), utrzymuje się po wysuszeniu; smak łagodny u młodych owocników, u starych cierpkawy i ostry.
- Zarodniki** Wysyp zarodników biały. Zarodniki szeroko elipsoidalne, nieco przybliżone, gładkie, hialinowe, z jedną kroplą, rzadziej z 2-3, 5-6 × 3.5-4.5 μm.
- Występowanie** Bardzo rzadka. Owocniki jednoroczne wyrastają latem i jesienią, przez szereg kolejnych lat na danym stanowisku, u podstawy pnia żywych i martwych drzew liściastych, pniaków i na korzeniach, zwłaszcza dębów i grabów, rzadziej kasztana jadalnego.
- Status na Czerwonej Liście: V - narażony.**
- Wartość** W Polsce podlega ochronie. Wywołuje białą miękką zgniliznę drewna.
- Uwagi** Podobne bardzo duże kępy owocników tworzy [wachlarzowiec olbrzymi \(Meripilus giganteus\)](#), wyrasta zwłaszcza na bukach, jego rurki i powierzchnia kapelusza przy ucisku czernieją, kapelusze są większe, koncentrycznie strefowane, żółtoochrowe do kasztanowobrązowych, bez trzonu lub z krótkim. Podobnie zbudowana [żagiew wielogłowa \(Dendropolyporus umbellatus\)](#) ma o wiele liczniejsze i mniejsze kapelusiki, z centralnie osadzonym trzonem.
- Literatura** Domański S., Orłowski H., Skirgiełło A., 1967 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (*Polyporaceae pileatae*), Szczeciniakowate II (*Mucronoporaceae pileatae*). Lakownicowate (*Ganodermataceae*). Bondarcewowate (*Bondarzewiaceae*). Boletkowate (*Boletopsidaceae*). Ozorkowate (*Fistulinaceae*). p.84 [17]
Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 - Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi n.394 [26II]
Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 - Houby. p.112 [49]

informacje o gatunku pochodzą ze strony prowadzonej przez Pana Marka Snowarskiego www.grzyby.pl