



***Pycnoporellus alboluteus* (ELLIS & EVERH.) KOTL. & POUZAR**
pomarańczowiec bladożółty [oranżowiec bladożółty]

- Owocnik** **Owocnik** jednoroczny, rozpostarty, rzadziej rozpostarto-odgięty; gruby na 5-40 mm, poduszkowaty, duży - rozrośnięty na przestrzeni kilkudziesięciu i więcej cm; barwa wszystkich części owocnika, w miarę rozwoju, zmienia się od białej do pomarańczowej; owocnik zbudowany z rurek 5-30 mm długości umieszczonych na cienkim 0.5-2 mm łożysku, w odgiętych kapelusikach nieco grubszym (do 3 mm), słabo przyrośnięty do podłoża; barwa łożyska początkowo biaława z pomarańczowym odcieniem, z wiekiem pomarańczowa; barwa odgiętych kapelusików pomarańczowa, z wiekiem ciemniejsza, niestrefowana, ich powierzchnia rzadko owłosiona.
- Pory** najpierw białe do żółtawych, z wiekiem ciemnieją przy czym zabarwienie intensywniejsze ku podstawie rurek, w końcu pomarańczowe; duże, 1-3 mm średnicy, wielokątne do wydłużonych i labiryntowatych. **Rurki** jaśniejsze od porów; ostrza z wiekiem głęboko porozrywane, aż do formy zębów.
- Miaższ** młodych owocników soczysty, miękki, gąbczasty i elastyczny, po wyschnięciu lekki i kruchy. Z KOH wszystkie części owocnika krwistoczerwone. Wysuszony owocnik pomarańczowy a wewnątrz ściany rurek z białym nalotem.
- Zarodniki** Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, elipsoidarno-cylindryczne, u podstawy niektóre ścięte, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 7-9(14) × (2.5)3-4 μm.
- Występowanie** Bardzo rzadki, w Polsce częściej w Białowieży. Owocniki wyrastają na spodniej stronie leżących kłód drzew iglastych, zwłaszcza świerka, rzadko buka.

Status na Czerwonej Liście: E - wymierający.

Wartość W Polsce podlega ochronie. Powoduje [brunatną zgniliznę drewna](#).

Uwagi Drugi gatunek w tym rodzaju, [pomarańczowiec błyszczący \(*Pycnoporellus fulgens*\)](#) tworzy zwykle wyraźne kapłusze, ma mniejsze pory i zarodniki.

Literatura Domański S., Orłowski H., Skirgiełło A., 1967 - Flora Polska. Grzyby (*Mycota*). Tom III. Żagwiowate II (*Polyporaceae pileatae*), Szczeciniakowate II (*Mucronoporaceae pileatae*). Lakownicowate (*Ganodermataceae*). Bondarcewowate (*Bondarzewiaceae*). Boletkowate (*Boletopsidaceae*). Ozorkowate (*Fistulinaceae*). p.166 [17]
Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 - Houby. p.114 [49]

informacje o gatunku pochodzą ze strony prowadzonej przez Pana Marka Snowarskiego www.grzyby.pl